

表 1072 脳梗塞の既往 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前補正 カルシウム濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
7.0未満 (%)	124 (87.3)	18 (12.7)	142 (100.0)		18	160
7.0～ (%)	190 (85.2)	33 (14.8)	223 (100.0)		36	259
7.5～ (%)	672 (85.4)	115 (14.6)	787 (100.0)	1	163	951
8.0～ (%)	2,054 (85.4)	350 (14.6)	2,404 (100.0)	4	460	2,868
8.4～ (%)	595 (84.0)	113 (16.0)	708 (100.0)	1	109	818
8.5～ (%)	6,614 (84.1)	1,255 (15.9)	7,869 (100.0)	15	1,417	9,301
9.0～ (%)	8,102 (83.4)	1,610 (16.6)	9,712 (100.0)	25	1,778	11,515
9.5～ (%)	5,259 (82.5)	1,114 (17.5)	6,373 (100.0)	11	1,228	7,612
10.0～ (%)	600 (81.5)	136 (18.5)	736 (100.0)		167	903
10.1～ (%)	1,694 (82.4)	363 (17.6)	2,057 (100.0)	9	386	2,452
10.5～ (%)	780 (80.9)	184 (19.1)	964 (100.0)	3	203	1,170
11.0～ (%)	240 (75.2)	79 (24.8)	319 (100.0)	1	63	383
11.5～ (%)	88 (80.7)	21 (19.3)	109 (100.0)	3	20	132
12.0～ (%)	50 (78.1)	14 (21.9)	64 (100.0)		7	71
合計 (%)	27,062 (83.4)	5,405 (16.6)	32,467 (100.0)	73	6,055	38,595
記載なし (%)	340 (80.0)	85 (20.0)	425 (100.0)	11	915	1,351
総計 (%)	27,402 (83.3)	5,490 (16.7)	32,892 (100.0)	84	6,970	39,946
平均	9.17	9.24	9.18	9.43	9.20	9.19
標準偏差	0.75	0.75	0.75	0.81	0.73	0.75

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査