

表 1073 脳梗塞の既往 透析前リン濃度(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前リン濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
3未満 (%)	726 (75.0)	242 (25.0)	968 (100.0)	2	163	1,133
3.0～ (%)	1,076 (80.3)	264 (19.7)	1,340 (100.0)	2	232	1,574
3.5～ (%)	1,958 (81.6)	442 (18.4)	2,400 (100.0)	11	438	2,849
4.0～ (%)	3,155 (81.6)	713 (18.4)	3,868 (100.0)	9	688	4,565
4.5～ (%)	3,976 (83.2)	804 (16.8)	4,780 (100.0)	6	926	5,712
5.0～ (%)	4,323 (83.9)	830 (16.1)	5,153 (100.0)	20	961	6,134
5.5～ (%)	3,764 (84.8)	675 (15.2)	4,439 (100.0)	4	856	5,299
6.0～ (%)	679 (85.4)	116 (14.6)	795 (100.0)	2	153	950
6.1～ (%)	2,274 (84.3)	424 (15.7)	2,698 (100.0)	2	544	3,244
6.5～ (%)	1,980 (84.5)	364 (15.5)	2,344 (100.0)	7	455	2,806
7.0～ (%)	1,286 (85.1)	225 (14.9)	1,511 (100.0)	3	261	1,775
7.5～ (%)	799 (86.7)	123 (13.3)	922 (100.0)	1	181	1,104
8.0～ (%)	478 (86.4)	75 (13.6)	553 (100.0)	2	96	651
8.5～ (%)	298 (83.9)	57 (16.1)	355 (100.0)		68	423
9.0～ (%)	484 (85.2)	84 (14.8)	568 (100.0)	1	113	682
合計 (%)	27,256 (83.4)	5,438 (16.6)	32,694 (100.0)	72	6,135	38,901
記載なし (%)	146 (73.7)	52 (26.3)	198 (100.0)	12	835	1,045
総計 (%)	27,402 (83.3)	5,490 (16.7)	32,892 (100.0)	84	6,970	39,946
平均	5.38	5.20	5.35	5.12	5.38	5.36
標準偏差	1.42	1.44	1.43	1.38	1.41	1.43

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査