

表 1074 脳梗塞の既往 PTH値(pg/mL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）PTH測定法:intact-PTH

PTH値	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	1,181 (82.4)	253 (17.6)	1,434 (100.0)	6	243	1,683
20～ (%)	1,480 (81.1)	345 (18.9)	1,825 (100.0)	8	362	2,195
40～ (%)	1,662 (81.0)	390 (19.0)	2,052 (100.0)	4	381	2,437
60～ (%)	1,816 (83.5)	359 (16.5)	2,175 (100.0)	5	412	2,592
80～ (%)	1,980 (82.6)	416 (17.4)	2,396 (100.0)	5	445	2,846
100～ (%)	1,949 (83.1)	397 (16.9)	2,346 (100.0)	7	442	2,795
120～ (%)	1,795 (83.3)	359 (16.7)	2,154 (100.0)	5	422	2,581
140～ (%)	1,639 (83.5)	324 (16.5)	1,963 (100.0)	4	356	2,323
160～ (%)	1,493 (83.0)	305 (17.0)	1,798 (100.0)	5	347	2,150
180～ (%)	3,549 (84.8)	637 (15.2)	4,186 (100.0)	7	812	5,005
240～ (%)	57 (80.3)	14 (19.7)	71 (100.0)		6	77
241～ (%)	2,098 (84.4)	387 (15.6)	2,485 (100.0)	8	462	2,955
300～ (%)	1,226 (84.9)	218 (15.1)	1,444 (100.0)	1	269	1,714
360～ (%)	729 (85.2)	127 (14.8)	856 (100.0)	4	182	1,042
420～ (%)	402 (85.4)	69 (14.6)	471 (100.0)		120	591
480～ (%)	106 (84.1)	20 (15.9)	126 (100.0)		20	146
500～ (%)	154 (83.7)	30 (16.3)	184 (100.0)		53	237
540～ (%)	172 (81.9)	38 (18.1)	210 (100.0)	1	41	252
600～ (%)	311 (85.4)	53 (14.6)	364 (100.0)		59	423
800～ (%)	253 (83.8)	49 (16.2)	302 (100.0)	1	47	350
合計 (%)	24,052 (83.4)	4,790 (16.6)	28,842 (100.0)	71	5,481	34,394
記載なし (%)	423 (82.8)	88 (17.2)	511 (100.0)	7	216	734
総計 (%)	24,475 (83.4)	4,878 (16.6)	29,353 (100.0)	78	5,697	35,128
平均	178.51	171.16	177.29	155.00	177.38	177.26
標準偏差	169.80	179.68	171.50	137.16	158.65	169.45

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査