

表 1076 脳梗塞の既往 透析前ヘモグロビン濃度(g/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前ヘモグロビン濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
5未満	18	6	24		2	26
(%)	(75.0)	(25.0)	(100.0)			
5～	24	3	27	1	3	31
(%)	(88.9)	(11.1)	(100.0)			
6～	84	18	102		12	114
(%)	(82.4)	(17.6)	(100.0)			
7～	310	77	387		58	445
(%)	(80.1)	(19.9)	(100.0)			
8～	1,088	295	1,383	7	247	1,637
(%)	(78.7)	(21.3)	(100.0)			
9～	3,975	917	4,892	19	939	5,850
(%)	(81.3)	(18.7)	(100.0)			
10～	9,005	1,780	10,785	26	2,136	12,947
(%)	(83.5)	(16.5)	(100.0)			
11～	8,230	1,491	9,721	13	1,843	11,577
(%)	(84.7)	(15.3)	(100.0)			
12～	3,138	573	3,711	6	665	4,382
(%)	(84.6)	(15.4)	(100.0)			
13～	827	178	1,005	1	179	1,185
(%)	(82.3)	(17.7)	(100.0)			
14～	391	67	458		65	523
(%)	(85.4)	(14.6)	(100.0)			
合計	27,090	5,405	32,495	73	6,149	38,717
(%)	(83.4)	(16.6)	(100.0)			
記載なし	312	85	397	11	821	1,229
(%)	(78.6)	(21.4)	(100.0)			
総計	27,402	5,490	32,892	84	6,970	39,946
(%)	(83.3)	(16.7)	(100.0)			
平均	10.86	10.75	10.84	10.29	10.83	10.84
標準偏差	1.27	1.31	1.28	1.22	1.20	1.26

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査