

表 1077 脳梗塞の既往 総コレステロール濃度(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

総コレステロール濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
100未満 (%)	655 (78.7)	177 (21.3)	832 (100.0)	9	151	992
100～ (%)	1,955 (80.1)	486 (19.9)	2,441 (100.0)	10	537	2,988
120～ (%)	3,905 (82.1)	849 (17.9)	4,754 (100.0)	14	926	5,694
140～ (%)	4,823 (83.1)	983 (16.9)	5,806 (100.0)	10	1,089	6,905
160～ (%)	4,255 (84.9)	757 (15.1)	5,012 (100.0)	16	983	6,011
180～ (%)	2,772 (85.6)	467 (14.4)	3,239 (100.0)	3	631	3,873
200～ (%)	1,610 (86.1)	260 (13.9)	1,870 (100.0)	5	378	2,253
220～ (%)	676 (85.9)	111 (14.1)	787 (100.0)	1	168	956
240～ (%)	271 (84.7)	49 (15.3)	320 (100.0)		64	384
260～ (%)	138 (83.1)	28 (16.9)	166 (100.0)	1	49	216
合計 (%)	21,060 (83.5)	4,167 (16.5)	25,227 (100.0)	69	4,976	30,272
記載なし (%)	6,342 (82.7)	1,323 (17.3)	7,665 (100.0)	15	1,994	9,674
総計 (%)	27,402 (83.3)	5,490 (16.7)	32,892 (100.0)	84	6,970	39,946
平均	158.74	154.05	157.96	144.80	158.41	158.00
標準偏差	35.36	35.96	35.50	40.30	36.56	35.70

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査