

表 1078 脳梗塞の既往 HDL-C濃度(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

HDL-C濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満	45	23	68		13	81
(%)	(66.2)	(33.8)	(100.0)			
20～	1,219	350	1,569	1	304	1,874
(%)	(77.7)	(22.3)	(100.0)			
30～	4,244	910	5,154	19	958	6,131
(%)	(82.3)	(17.7)	(100.0)			
40～	5,044	1,104	6,148	10	1,202	7,360
(%)	(82.0)	(18.0)	(100.0)			
50～	4,222	753	4,975	10	986	5,971
(%)	(84.9)	(15.1)	(100.0)			
60～	2,838	413	3,251	11	595	3,857
(%)	(87.3)	(12.7)	(100.0)			
70～	1,448	224	1,672	4	347	2,023
(%)	(86.6)	(13.4)	(100.0)			
80～	756	84	840	3	170	1,013
(%)	(90.0)	(10.0)	(100.0)			
90～	313	44	357	3	71	431
(%)	(87.7)	(12.3)	(100.0)			
100～	283	29	312		71	383
(%)	(90.7)	(9.3)	(100.0)			
合計	20,412	3,934	24,346	61	4,717	29,124
(%)	(83.8)	(16.2)	(100.0)			
記載なし	6,990	1,556	8,546	23	2,253	10,822
(%)	(81.8)	(18.2)	(100.0)			
総計	27,402	5,490	32,892	84	6,970	39,946
(%)	(83.3)	(16.7)	(100.0)			
平均	51.35	47.82	50.78	52.52	51.24	50.85
標準偏差	17.29	15.93	17.13	18.24	17.44	17.18

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査