

表 1079 脳梗塞の既往 Non-HDL-C濃度(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

Non-HDL-C濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
50未満	347	74	421	9	99	529
(%)	(82.4)	(17.6)	(100.0)			
50～	1,614	354	1,968	8	427	2,403
(%)	(82.0)	(18.0)	(100.0)			
70～	3,527	728	4,255	19	864	5,138
(%)	(82.9)	(17.1)	(100.0)			
90～	4,362	856	5,218	10	1,037	6,265
(%)	(83.6)	(16.4)	(100.0)			
110～	3,596	679	4,275	4	883	5,162
(%)	(84.1)	(15.9)	(100.0)			
130～	2,188	411	2,599	7	543	3,149
(%)	(84.2)	(15.8)	(100.0)			
150～	1,106	206	1,312	1	284	1,597
(%)	(84.3)	(15.7)	(100.0)			
170～	483	86	569	1	112	682
(%)	(84.9)	(15.1)	(100.0)			
190～	183	27	210		52	262
(%)	(87.1)	(12.9)	(100.0)			
210～	90	21	111		30	141
(%)	(81.1)	(18.9)	(100.0)			
合計	17,496	3,442	20,938	59	4,331	25,328
(%)	(83.6)	(16.4)	(100.0)			
記載なし	9,906	2,048	11,954	25	2,639	14,618
(%)	(82.9)	(17.1)	(100.0)			
総計	27,402	5,490	32,892	84	6,970	39,946
(%)	(83.3)	(16.7)	(100.0)			
平均	107.39	105.80	107.13	86.37	107.37	107.12
標準偏差	33.20	33.25	33.21	34.16	34.04	33.37

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査