

表 1080 脳梗塞の既往 透析前収縮期血圧(mmHg)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前収縮 期血圧	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
60未満 (%)	2 (100.0)		2 (100.0)			2
60～ (%)	85 (86.7)	13 (13.3)	98 (100.0)		17	115
80～ (%)	437 (82.5)	93 (17.5)	530 (100.0)	4	81	615
100～ (%)	1,971 (83.1)	402 (16.9)	2,373 (100.0)	5	422	2,800
120～ (%)	5,396 (84.5)	993 (15.5)	6,389 (100.0)	18	1,232	7,639
140～ (%)	8,093 (84.3)	1,506 (15.7)	9,599 (100.0)	22	1,812	11,433
160～ (%)	5,784 (83.6)	1,134 (16.4)	6,918 (100.0)	17	1,373	8,308
180～ (%)	2,159 (81.6)	488 (18.4)	2,647 (100.0)	5	502	3,154
200～ (%)	549 (79.6)	141 (20.4)	690 (100.0)		132	822
220～ (%)	145 (80.6)	35 (19.4)	180 (100.0)		36	216
合計 (%)	24,621 (83.7)	4,805 (16.3)	29,426 (100.0)	71	5,607	35,104
記載なし (%)	2,781 (80.2)	685 (19.8)	3,466 (100.0)	13	1,363	4,842
総計 (%)	27,402 (83.3)	5,490 (16.7)	32,892 (100.0)	84	6,970	39,946
平均	150.36	151.63	150.56	145.34	151.27	150.67
標準偏差	24.92	25.97	25.10	23.96	24.74	25.04

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査