

表 1093 脳梗塞の既往 身長(cm)別（腹膜透析患者）

身長	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
130未満	55	3	58		4	62
(%)	(94.8)	(5.2)	(100.0)			
130～	9	1	10		1	11
(%)	(90.0)	(10.0)	(100.0)			
135～	52	4	56		6	62
(%)	(92.9)	(7.1)	(100.0)			
140～	160	29	189	1	37	227
(%)	(84.7)	(15.3)	(100.0)			
145～	337	49	386	2	82	470
(%)	(87.3)	(12.7)	(100.0)			
150～	615	99	714	3	150	867
(%)	(86.1)	(13.9)	(100.0)			
155～	780	96	876	2	171	1,049
(%)	(89.0)	(11.0)	(100.0)			
160～	944	140	1,084	2	244	1,330
(%)	(87.1)	(12.9)	(100.0)			
165～	876	135	1,011	5	196	1,212
(%)	(86.6)	(13.4)	(100.0)			
170～	640	84	724	4	176	904
(%)	(88.4)	(11.6)	(100.0)			
175～	276	28	304	1	61	366
(%)	(90.8)	(9.2)	(100.0)			
180～	66	6	72		15	87
(%)	(91.7)	(8.3)	(100.0)			
185～	11		11	1	1	13
(%)	(100.0)		(100.0)			
190～	2	1	3		1	4
(%)	(66.7)	(33.3)	(100.0)			
合計	4,823	675	5,498	21	1,145	6,664
(%)	(87.7)	(12.3)	(100.0)			
記載なし	401	59	460	16	1,801	2,277
(%)	(87.2)	(12.8)	(100.0)			
総計	5,224	734	5,958	37	2,946	8,941
(%)	(87.7)	(12.3)	(100.0)			
平均	160.45	160.32	160.43	162.67	161.10	160.56
標準偏差	11.99	9.92	11.76	11.87	10.75	11.59

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査