

表 1094 脳梗塞の既往 体重(kg)別（腹膜透析患者）

体重	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満	37	1	38			38
(%)	(97.4)	(2.6)	(100.0)			
20～	23		23			23
(%)	(100.0)		(100.0)			
30～	142	16	158	1	13	172
(%)	(89.9)	(10.1)	(100.0)			
40～	718	105	823	3	78	904
(%)	(87.2)	(12.8)	(100.0)			
50～	1,248	173	1,421	8	162	1,591
(%)	(87.8)	(12.2)	(100.0)			
60～	1,287	156	1,443	6	167	1,616
(%)	(89.2)	(10.8)	(100.0)			
70～	640	82	722	2	87	811
(%)	(88.6)	(11.4)	(100.0)			
80～	249	15	264	4	30	298
(%)	(94.3)	(5.7)	(100.0)			
90～	81	7	88	1	15	104
(%)	(92.0)	(8.0)	(100.0)			
100～	15	2	17		3	20
(%)	(88.2)	(11.8)	(100.0)			
110～	8		8		2	10
(%)	(100.0)		(100.0)			
120～	7	2	9			9
(%)	(77.8)	(22.2)	(100.0)			
合計	4,455	559	5,014	25	557	5,596
(%)	(88.9)	(11.1)	(100.0)			
記載なし	769	175	944	12	2,389	3,345
(%)	(81.5)	(18.5)	(100.0)			
総計	5,224	734	5,958	37	2,946	8,941
(%)	(87.7)	(12.3)	(100.0)			
平均	60.65	59.76	60.55	64.08	62.31	60.74
標準偏差	14.13	12.69	13.97	14.33	13.06	13.90

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査