

表 1095 脳梗塞の既往 Body Mass Index別（腹膜透析患者）

Body Mass Index	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
14未満	21	4	25		2	27
(%)	(84.0)	(16.0)	(100.0)			
14～	63	4	67	1	3	71
(%)	(94.0)	(6.0)	(100.0)			
16～	190	27	217		11	228
(%)	(87.6)	(12.4)	(100.0)			
18～	507	63	570	1	56	627
(%)	(88.9)	(11.1)	(100.0)			
20～	922	122	1,044	4	92	1,140
(%)	(88.3)	(11.7)	(100.0)			
22～	984	137	1,121	3	137	1,261
(%)	(87.8)	(12.2)	(100.0)			
24～	749	85	834	2	72	908
(%)	(89.8)	(10.2)	(100.0)			
26～	452	57	509	4	48	561
(%)	(88.8)	(11.2)	(100.0)			
28～	243	27	270	2	30	302
(%)	(90.0)	(10.0)	(100.0)			
30～	177	16	193	2	25	220
(%)	(91.7)	(8.3)	(100.0)			
合計	4,308	542	4,850	19	476	5,345
(%)	(88.8)	(11.2)	(100.0)			
記載なし	916	192	1,108	18	2,470	3,596
(%)	(82.7)	(17.3)	(100.0)			
総計	5,224	734	5,958	37	2,946	8,941
(%)	(87.7)	(12.3)	(100.0)			
平均	23.13	22.98	23.11	24.62	23.41	23.15
標準偏差	3.62	3.49	3.60	4.24	3.51	3.60

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査