

表 1096 脳梗塞の既往 BUN(mg/dL)別（腹膜透析患者）

BUN	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満	17	6	23		6	29
(%)	(73.9)	(26.1)	(100.0)			
20～	141	36	177		6	183
(%)	(79.7)	(20.3)	(100.0)			
30～	500	99	599	5	68	672
(%)	(83.5)	(16.5)	(100.0)			
40～	1,039	165	1,204	7	181	1,392
(%)	(86.3)	(13.7)	(100.0)			
50～	1,246	143	1,389	7	217	1,613
(%)	(89.7)	(10.3)	(100.0)			
60～	895	95	990	4	156	1,150
(%)	(90.4)	(9.6)	(100.0)			
70～	450	34	484	1	64	549
(%)	(93.0)	(7.0)	(100.0)			
80～	196	19	215	2	28	245
(%)	(91.2)	(8.8)	(100.0)			
90～	72	7	79		10	89
(%)	(91.1)	(8.9)	(100.0)			
100～	29	3	32		8	40
(%)	(90.6)	(9.4)	(100.0)			
110～	7		7			7
(%)	(100.0)		(100.0)			
120～	5	1	6		1	7
(%)	(83.3)	(16.7)	(100.0)			
合計	4,597	608	5,205	26	745	5,976
(%)	(88.3)	(11.7)	(100.0)			
記載なし	627	126	753	11	2,201	2,965
(%)	(83.3)	(16.7)	(100.0)			
総計	5,224	734	5,958	37	2,946	8,941
(%)	(87.7)	(12.3)	(100.0)			
平均	55.30	50.92	54.79	52.65	55.79	54.90
標準偏差	15.92	15.88	15.97	14.49	14.77	15.82

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査