

表 1097 脳梗塞の既往 クレアチニン濃度(mg/dL)別（腹膜透析患者）

クレアチニン 濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
2未満 (%)	15 (100.0)		15 (100.0)		2	17
2～ (%)	105 (78.4)	29 (21.6)	134 (100.0)		20	154
4～ (%)	438 (83.6)	86 (16.4)	524 (100.0)	2	49	575
6～ (%)	868 (86.5)	136 (13.5)	1,004 (100.0)	7	122	1,133
8～ (%)	1,053 (88.3)	139 (11.7)	1,192 (100.0)	5	152	1,349
10～ (%)	841 (88.5)	109 (11.5)	950 (100.0)	5	160	1,115
12～ (%)	665 (91.1)	65 (8.9)	730 (100.0)	3	115	848
14～ (%)	374 (92.1)	32 (7.9)	406 (100.0)	3	79	488
16～ (%)	237 (95.2)	12 (4.8)	249 (100.0)	1	45	295
合計 (%)	4,596 (88.3)	608 (11.7)	5,204 (100.0)	26	744	5,974
記載なし (%)	628 (83.3)	126 (16.7)	754 (100.0)	11	2,202	2,967
総計 (%)	5,224 (87.7)	734 (12.3)	5,958 (100.0)	37	2,946	8,941
平均	9.94	8.88	9.81	9.94	10.38	9.89
標準偏差	3.55	3.18	3.52	3.17	3.53	3.53

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査