

表 1098 脳梗塞の既往 アルブミン濃度(g/dL)別 (腹膜透析患者)

アルブミン 濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
1.5未満 (%)	8 (66.7)	4 (33.3)	12 (100.0)		3	15
1.5～ (%)	48 (76.2)	15 (23.8)	63 (100.0)		8	71
2.0～ (%)	208 (76.8)	63 (23.2)	271 (100.0)		27	298
2.5～ (%)	761 (85.0)	134 (15.0)	895 (100.0)	4	138	1,037
3.0～ (%)	1,647 (88.0)	224 (12.0)	1,871 (100.0)	12	275	2,158
3.5～ (%)	1,528 (91.8)	136 (8.2)	1,664 (100.0)	7	235	1,906
4.0～ (%)	346 (92.8)	27 (7.2)	373 (100.0)	2	56	431
4.5～ (%)	19 (100.0)		19 (100.0)		2	21
5.0～ (%)	2 (100.0)		2 (100.0)			2
合計 (%)	4,567 (88.3)	603 (11.7)	5,170 (100.0)	25	744	5,939
記載なし (%)	657 (83.4)	131 (16.6)	788 (100.0)	12	2,202	3,002
総計 (%)	5,224 (87.7)	734 (12.3)	5,958 (100.0)	37	2,946	8,941
平均	3.30	3.09	3.28	3.35	3.28	3.28
標準偏差	0.51	0.56	0.52	0.46	0.51	0.52

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査