

表 1099 脳梗塞の既往 CRP濃度(mg/dL)別（腹膜透析患者）

CRP濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
0.2未満 (%)	2,442 (91.0)	242 (9.0)	2,684 (100.0)	11	372	3,067
0.2～ (%)	736 (85.5)	125 (14.5)	861 (100.0)	5	129	995
0.5～ (%)	328 (84.3)	61 (15.7)	389 (100.0)	1	59	449
1.0～ (%)	218 (82.9)	45 (17.1)	263 (100.0)	2	43	308
2.0～ (%)	143 (78.1)	40 (21.9)	183 (100.0)	2	17	202
4.0～ (%)	58 (79.5)	15 (20.5)	73 (100.0)	1	9	83
6.0～ (%)	25 (73.5)	9 (26.5)	34 (100.0)		6	40
8.0～ (%)	17 (77.3)	5 (22.7)	22 (100.0)		2	24
10.0～ (%)	30 (88.2)	4 (11.8)	34 (100.0)			34
15.0～ (%)	4 (57.1)	3 (42.9)	7 (100.0)			7
合計 (%)	4,001 (87.9)	549 (12.1)	4,550 (100.0)	22	637	5,209
記載なし (%)	1,223 (86.9)	185 (13.1)	1,408 (100.0)	15	2,309	3,732
総計 (%)	5,224 (87.7)	734 (12.3)	5,958 (100.0)	37	2,946	8,941
平均	0.59	1.04	0.65	0.78	0.50	0.63
標準偏差	1.64	2.57	1.78	1.40	1.07	1.71

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査