

表 1100 脳梗塞の既往 補正カルシウム濃度(mg/dL)別（腹膜透析患者）

補正 カルシウム濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
7.0未満 (%)	21 (91.3)	2 (8.7)	23 (100.0)		6	29
7.0～ (%)	28 (90.3)	3 (9.7)	31 (100.0)		5	36
7.5～ (%)	97 (95.1)	5 (4.9)	102 (100.0)	2	23	127
8.0～ (%)	211 (86.5)	33 (13.5)	244 (100.0)		42	286
8.4～ (%)	68 (89.5)	8 (10.5)	76 (100.0)	1	9	86
8.5～ (%)	712 (90.0)	79 (10.0)	791 (100.0)	5	110	906
9.0～ (%)	1,259 (89.2)	153 (10.8)	1,412 (100.0)	6	184	1,602
9.5～ (%)	1,260 (87.9)	173 (12.1)	1,433 (100.0)	5	191	1,629
10.0～ (%)	146 (86.9)	22 (13.1)	168 (100.0)	1	22	191
10.1～ (%)	409 (87.8)	57 (12.2)	466 (100.0)	4	87	557
10.5～ (%)	215 (84.3)	40 (15.7)	255 (100.0)		41	296
11.0～ (%)	80 (81.6)	18 (18.4)	98 (100.0)	1	12	111
11.5～ (%)	24 (92.3)	2 (7.7)	26 (100.0)		3	29
12.0～ (%)	21 (87.5)	3 (12.5)	24 (100.0)		3	27
合計 (%)	4,551 (88.4)	598 (11.6)	5,149 (100.0)	25	738	5,912
記載なし (%)	673 (83.2)	136 (16.8)	809 (100.0)	12	2,208	3,029
総計 (%)	5,224 (87.7)	734 (12.3)	5,958 (100.0)	37	2,946	8,941
平均	9.40	9.49	9.41	9.31	9.40	9.41
標準偏差	0.79	0.80	0.79	0.83	0.85	0.80

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査