

表 1101 脳梗塞の既往 リン濃度(mg/dL)別（腹膜透析患者）

リン濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
3未満	81	27	108	1	17	126
(%)	(75.0)	(25.0)	(100.0)			
3.0～	196	43	239	2	29	270
(%)	(82.0)	(18.0)	(100.0)			
3.5～	390	69	459	3	63	525
(%)	(85.0)	(15.0)	(100.0)			
4.0～	584	88	672	2	96	770
(%)	(86.9)	(13.1)	(100.0)			
4.5～	746	76	822	4	95	921
(%)	(90.8)	(9.2)	(100.0)			
5.0～	738	89	827	3	118	948
(%)	(89.2)	(10.8)	(100.0)			
5.5～	644	89	733	3	103	839
(%)	(87.9)	(12.1)	(100.0)			
6.0～	111	9	120		18	138
(%)	(92.5)	(7.5)	(100.0)			
6.1～	367	40	407	3	67	477
(%)	(90.2)	(9.8)	(100.0)			
6.5～	302	32	334	2	63	399
(%)	(90.4)	(9.6)	(100.0)			
7.0～	169	15	184		28	212
(%)	(91.8)	(8.2)	(100.0)			
7.5～	117	13	130	1	18	149
(%)	(90.0)	(10.0)	(100.0)			
8.0～	56	2	58		13	71
(%)	(96.6)	(3.4)	(100.0)			
8.5～	28	4	32		6	38
(%)	(87.5)	(12.5)	(100.0)			
9.0～	66	5	71	1	17	89
(%)	(93.0)	(7.0)	(100.0)			
合計	4,595	601	5,196	25	751	5,972
(%)	(88.4)	(11.6)	(100.0)			
記載なし	629	133	762	12	2,195	2,969
(%)	(82.5)	(17.5)	(100.0)			
総計	5,224	734	5,958	37	2,946	8,941
(%)	(87.7)	(12.3)	(100.0)			
平均	5.27	4.96	5.23	5.22	5.36	5.25
標準偏差	1.33	1.33	1.33	1.69	1.44	1.35

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査