

表 1102 脳梗塞の既往 PTH値(pg/mL)別（腹膜透析患者）PTH測定法:intact-PTH

PTH値	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	80 (80.0)	20 (20.0)	100 (100.0)		23	123
20～ (%)	211 (89.8)	24 (10.2)	235 (100.0)		46	281
40～ (%)	205 (90.7)	21 (9.3)	226 (100.0)	1	41	268
60～ (%)	253 (91.7)	23 (8.3)	276 (100.0)		39	315
80～ (%)	232 (86.2)	37 (13.8)	269 (100.0)	1	39	309
100～ (%)	232 (85.9)	38 (14.1)	270 (100.0)		46	316
120～ (%)	230 (88.1)	31 (11.9)	261 (100.0)		44	305
140～ (%)	224 (89.6)	26 (10.4)	250 (100.0)	2	33	285
160～ (%)	215 (87.0)	32 (13.0)	247 (100.0)		29	276
180～ (%)	491 (87.7)	69 (12.3)	560 (100.0)		94	654
240～ (%)	8 (88.9)	1 (11.1)	9 (100.0)		1	10
241～ (%)	330 (87.5)	47 (12.5)	377 (100.0)	1	53	431
300～ (%)	262 (89.7)	30 (10.3)	292 (100.0)		39	331
360～ (%)	149 (93.1)	11 (6.9)	160 (100.0)		40	200
420～ (%)	106 (89.8)	12 (10.2)	118 (100.0)	1	20	139
480～ (%)	32 (88.9)	4 (11.1)	36 (100.0)		7	43
500～ (%)	41 (91.1)	4 (8.9)	45 (100.0)		9	54
540～ (%)	51 (85.0)	9 (15.0)	60 (100.0)	1	12	73
600～ (%)	86 (92.5)	7 (7.5)	93 (100.0)		12	105
800～ (%)	86 (90.5)	9 (9.5)	95 (100.0)		15	110
合計 (%)	3,524 (88.6)	455 (11.4)	3,979 (100.0)	7	642	4,628
記載なし (%)	282 (90.4)	30 (9.6)	312 (100.0)		64	376
総計 (%)	3,806 (88.7)	485 (11.3)	4,291 (100.0)	7	706	5,004
平均	224.92	211.70	223.41	247.43	226.50	223.88
標準偏差	223.92	205.21	221.88	190.08	271.46	229.31

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査