

表 1105 脳梗塞の既往 総コレステロール濃度(mg/dL)別 (腹膜透析患者)

総コレステロール濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
100未満 (%)	33 (78.6)	9 (21.4)	42 (100.0)		8	50
100～ (%)	113 (86.9)	17 (13.1)	130 (100.0)		30	160
120～ (%)	343 (87.3)	50 (12.7)	393 (100.0)	2	53	448
140～ (%)	591 (85.3)	102 (14.7)	693 (100.0)	5	108	806
160～ (%)	656 (88.2)	88 (11.8)	744 (100.0)	6	115	865
180～ (%)	649 (88.2)	87 (11.8)	736 (100.0)	2	95	833
200～ (%)	449 (90.5)	47 (9.5)	496 (100.0)	4	64	564
220～ (%)	261 (90.6)	27 (9.4)	288 (100.0)	1	29	318
240～ (%)	128 (92.8)	10 (7.2)	138 (100.0)		21	159
260～ (%)	115 (92.7)	9 (7.3)	124 (100.0)		25	149
合計 (%)	3,338 (88.2)	446 (11.8)	3,784 (100.0)	20	548	4,352
記載なし (%)	1,886 (86.8)	288 (13.2)	2,174 (100.0)	17	2,398	4,589
総計 (%)	5,224 (87.7)	734 (12.3)	5,958 (100.0)	37	2,946	8,941
平均	180.26	172.40	179.34	173.05	176.99	179.01
標準偏差	40.66	37.23	40.35	26.86	42.19	40.54

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査