

表 1106 脳梗塞の既往 HDL-C濃度(mg/dL)別（腹膜透析患者）

HDL-C濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満	5	2	7		1	8
(%)	(71.4)	(28.6)	(100.0)			
20～	202	45	247	1	40	288
(%)	(81.8)	(18.2)	(100.0)			
30～	703	106	809	5	119	933
(%)	(86.9)	(13.1)	(100.0)			
40～	752	101	853	4	133	990
(%)	(88.2)	(11.8)	(100.0)			
50～	650	74	724	3	112	839
(%)	(89.8)	(10.2)	(100.0)			
60～	391	58	449	2	65	516
(%)	(87.1)	(12.9)	(100.0)			
70～	207	17	224		35	259
(%)	(92.4)	(7.6)	(100.0)			
80～	109	9	118	1	22	141
(%)	(92.4)	(7.6)	(100.0)			
90～	46	5	51		10	61
(%)	(90.2)	(9.8)	(100.0)			
100～	50	2	52		5	57
(%)	(96.2)	(3.8)	(100.0)			
合計	3,115	419	3,534	16	542	4,092
(%)	(88.1)	(11.9)	(100.0)			
記載なし	2,109	315	2,424	21	2,404	4,849
(%)	(87.0)	(13.0)	(100.0)			
総計	5,224	734	5,958	37	2,946	8,941
(%)	(87.7)	(12.3)	(100.0)			
平均	50.91	47.23	50.47	46.75	50.57	50.47
標準偏差	17.93	15.96	17.74	15.83	17.66	17.72

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査