

表 1107 脳梗塞の既往 Non-HDL-C濃度(mg/dL)別（腹膜透析患者）

Non-HDL-C濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
50未満	15	1	16		2	18
(%)	(93.8)	(6.3)	(100.0)			
50～	82	16	98		16	114
(%)	(83.7)	(16.3)	(100.0)			
70～	260	38	298	1	52	351
(%)	(87.2)	(12.8)	(100.0)			
90～	495	85	580	4	76	660
(%)	(85.3)	(14.7)	(100.0)			
110～	605	80	685	1	111	797
(%)	(88.3)	(11.7)	(100.0)			
130～	507	63	570	1	91	662
(%)	(88.9)	(11.1)	(100.0)			
150～	336	46	382	3	51	436
(%)	(88.0)	(12.0)	(100.0)			
170～	212	23	235	1	27	263
(%)	(90.2)	(9.8)	(100.0)			
190～	96	12	108		12	120
(%)	(88.9)	(11.1)	(100.0)			
210～	66	10	76		14	90
(%)	(86.8)	(13.2)	(100.0)			
合計	2,674	374	3,048	11	452	3,511
(%)	(87.7)	(12.3)	(100.0)			
記載なし	2,550	360	2,910	26	2,494	5,430
(%)	(87.6)	(12.4)	(100.0)			
総計	5,224	734	5,958	37	2,946	8,941
(%)	(87.7)	(12.3)	(100.0)			
平均	129.04	126.28	128.70	125.18	127.01	128.47
標準偏差	37.93	38.06	37.95	32.49	38.56	38.01

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査