

表 1108 脳梗塞の既往 収縮期血圧(mmHg)別（腹膜透析患者）

| 収縮期血圧       | 既往なし            | 既往あり          | 合計               | 不明     | 記載なし   | 総計     |
|-------------|-----------------|---------------|------------------|--------|--------|--------|
| 60未満<br>(%) |                 |               |                  |        | 1      | 1      |
| 60～<br>(%)  | 9<br>(75.0)     | 3<br>(25.0)   | 12<br>(100.0)    |        | 1      | 13     |
| 80～<br>(%)  | 85<br>(76.6)    | 26<br>(23.4)  | 111<br>(100.0)   | 1      | 12     | 124    |
| 100～<br>(%) | 495<br>(86.1)   | 80<br>(13.9)  | 575<br>(100.0)   | 2      | 64     | 641    |
| 120～<br>(%) | 1,220<br>(89.3) | 146<br>(10.7) | 1,366<br>(100.0) | 12     | 138    | 1,516  |
| 140～<br>(%) | 1,270<br>(89.1) | 155<br>(10.9) | 1,425<br>(100.0) | 7      | 147    | 1,579  |
| 160～<br>(%) | 572<br>(89.4)   | 68<br>(10.6)  | 640<br>(100.0)   | 3      | 78     | 721    |
| 180～<br>(%) | 163<br>(84.5)   | 30<br>(15.5)  | 193<br>(100.0)   |        | 24     | 217    |
| 200～<br>(%) | 24<br>(88.9)    | 3<br>(11.1)   | 27<br>(100.0)    |        | 4      | 31     |
| 220～<br>(%) | 6<br>(75.0)     | 2<br>(25.0)   | 8<br>(100.0)     |        | 2      | 10     |
| 合計<br>(%)   | 3,844<br>(88.2) | 513<br>(11.8) | 4,357<br>(100.0) | 25     | 471    | 4,853  |
| 記載なし<br>(%) | 1,380<br>(86.2) | 221<br>(13.8) | 1,601<br>(100.0) | 12     | 2,475  | 4,088  |
| 総計<br>(%)   | 5,224<br>(87.7) | 734<br>(12.3) | 5,958<br>(100.0) | 37     | 2,946  | 8,941  |
| 平均          | 141.01          | 139.41        | 140.83           | 136.92 | 142.93 | 141.01 |
| 標準偏差        | 22.32           | 25.68         | 22.74            | 18.86  | 24.24  | 22.88  |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査