

表 1109 脳梗塞の既往 拡張期血圧(mmHg)別（腹膜透析患者）

拡張期血圧	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	1 (100.0)		1 (100.0)			1
20～ (%)	10 (71.4)	4 (28.6)	14 (100.0)		1	15
40～ (%)	274 (82.0)	60 (18.0)	334 (100.0)	3	38	375
60～ (%)	1,625 (86.6)	251 (13.4)	1,876 (100.0)	12	177	2,065
80～ (%)	1,032 (90.2)	112 (9.8)	1,144 (100.0)	6	146	1,296
90～ (%)	589 (91.3)	56 (8.7)	645 (100.0)	3	66	714
100～ (%)	280 (91.8)	25 (8.2)	305 (100.0)	1	41	347
120～ (%)	14 (87.5)	2 (12.5)	16 (100.0)		2	18
140～ (%)	1 (100.0)		1 (100.0)			1
合計 (%)	3,826 (88.2)	510 (11.8)	4,336 (100.0)	25	471	4,832
記載なし (%)	1,398 (86.2)	224 (13.8)	1,622 (100.0)	12	2,475	4,109
総計 (%)	5,224 (87.7)	734 (12.3)	5,958 (100.0)	37	2,946	8,941
平均	79.38	75.26	78.90	76.04	80.25	79.01
標準偏差	14.33	14.71	14.44	15.63	14.29	14.43

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査