

表 1111 四肢切断の有無 治療方法別（透析患者全体）

| 治療方法 | 切断なし | 切断あり | 合計 | 不明 | 記載なし | 総計 |
|---------------|-------------------|----------------|--------------------|-----|--------|---------|
| 施設血液透析 (%) | 188,856 (96.2) | 7,466 (3.8) | 196,322 (100.0) | 288 | 59,031 | 255,641 |
| 血液透析濾過 (%) | 32,459 (96.5) | 1,187 (3.5) | 33,646 (100.0) | 9 | 9,628 | 43,283 |
| 血液濾過 (%) | 14 (100.0) | | 14 (100.0) | | 78 | 92 |
| 血液吸着透析 (%) | 1,291 (97.9) | 28 (2.1) | 1,319 (100.0) | | 311 | 1,630 |
| 在宅血液透析 (%) | 361 (98.9) | 4 (1.1) | 365 (100.0) | 3 | 153 | 521 |
| 腹膜透析 (%) | 5,826 (98.3) | 102 (1.7) | 5,928 (100.0) | 20 | 2,993 | 8,941 |
| 合計 (%) | 228,807 (96.3) | 8,787 (3.7) | 237,594 (100.0) | 320 | 72,194 | 310,108 |
| 記載なし (%) | | | | | | |
| 総計 (%) | 228,807 (96.3) | 8,787 (3.7) | 237,594 (100.0) | 320 | 72,194 | 310,108 |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査