

表 1112 四肢切断の有無 治療方法(新分類)別(透析患者全体)

治療方法 (新分類)	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
施設血液透析	188,856	7,466	196,322	288	59,031	255,641
(%)	(96.2)	(3.8)	(100.0)			
Off-line HDF	4,657	233	4,890	1	1,424	6,315
(%)	(95.2)	(4.8)	(100.0)			
On-line HDF	27,199	923	28,122	8	7,960	36,090
(%)	(96.7)	(3.3)	(100.0)			
Push/Pull HDF	324	13	337		200	537
(%)	(96.1)	(3.9)	(100.0)			
ハイオフィルトレーション	279	18	297		44	341
(%)	(93.9)	(6.1)	(100.0)			
血液濾過	14		14		78	92
(%)	(100.0)		(100.0)			
血液吸着透析 (リクセル)	1,288	26	1,314		309	1,623
(%)	(98.0)	(2.0)	(100.0)			
血液吸着透析 (その他)	3	2	5		2	7
(%)	(60.0)	(40.0)	(100.0)			
在宅血液透析	361	4	365	3	153	521
(%)	(98.9)	(1.1)	(100.0)			
腹膜透析 (CAPD)	3,121	58	3,179	14	1,828	5,021
(%)	(98.2)	(1.8)	(100.0)			
腹膜透析 (APD)	1,927	28	1,955	3	881	2,839
(%)	(98.6)	(1.4)	(100.0)			
腹膜透析 (CCPD)	778	16	794	3	284	1,081
(%)	(98.0)	(2.0)	(100.0)			
合計	228,807	8,787	237,594	320	72,194	310,108
(%)	(96.3)	(3.7)	(100.0)			
記載なし						
(%)						
総計	228,807	8,787	237,594	320	72,194	310,108
(%)	(96.3)	(3.7)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
 *腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの
 (C)Japanese Society for Dialysis Therapy
 2014年調査