

表 1115 四肢切断の有無 年齢(歳)別 (透析患者全体)

年齢	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満	71		71		46	117
(%)	(100.0)		(100.0)			
15歳～	798	5	803	2	232	1,037
(%)	(99.4)	(0.6)	(100.0)			
30歳～	10,846	261	11,107	13	3,265	14,385
(%)	(97.7)	(2.3)	(100.0)			
45歳～	41,727	1,904	43,631	47	12,890	56,568
(%)	(95.6)	(4.4)	(100.0)			
60歳～	104,084	4,541	108,625	145	33,208	141,978
(%)	(95.8)	(4.2)	(100.0)			
75歳～	67,490	2,013	69,503	108	21,386	90,997
(%)	(97.1)	(2.9)	(100.0)			
90歳～	3,780	63	3,843	5	1,157	5,005
(%)	(98.4)	(1.6)	(100.0)			
合計	228,796	8,787	237,583	320	72,184	310,087
(%)	(96.3)	(3.7)	(100.0)			
不明	11		11		10	21
(%)	(100.0)		(100.0)			
記載なし						
(%)						
総計	228,807	8,787	237,594	320	72,194	310,108
(%)	(96.3)	(3.7)	(100.0)			
平均	67.53	66.35	67.49	68.90	67.70	67.54
標準偏差	12.56	10.85	12.50	12.49	12.46	12.49

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査