

表 1120 四肢切断の有無 被囊性腹膜硬化症(EPS)の既往別 (腹膜透析の経験があるか現在施行している患者)

被囊性腹膜硬化症 (EPS)の既往	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
なし	11,881	239	12,120	3	66	12,189
(%)	(95.3)	(89.2)	(95.2)	(100.0)	(50.0)	(94.7)
あり(剥離手術既往あり、 ステロイド使用歴あり)	439	26	465		60	525
(%)	(3.5)	(9.7)	(3.7)		(45.5)	(4.1)
あり(剥離手術既往あり、 ステロイド使用歴なし)	15		15		1	16
(%)	(0.1)		(0.1)		(0.8)	(0.1)
あり(剥離手術既往なし、 ステロイド使用歴あり)	63	2	65		3	68
(%)	(0.5)	(0.7)	(0.5)		(2.3)	(0.5)
あり(剥離手術既往なし、 ステロイド使用歴なし)	64	1	65		2	67
(%)	(0.5)	(0.4)	(0.5)		(1.5)	(0.5)
合計	12,462	268	12,730	3	132	12,865
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)
不明	268	11	279	22	3	304
記載なし	205	38	243		3,718	3,961
総計	12,935	317	13,252	25	3,853	17,130

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査