

表 1129 四肢切断の有無 透析前アルブミン濃度(g/dL)別（透析患者全体）

透析前アルブミン濃度	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
1.5未満 (%)	153 (95.6)	7 (4.4)	160 (100.0)	1	24	185
1.5～ (%)	748 (90.4)	79 (9.6)	827 (100.0)	3	159	989
2.0～ (%)	3,202 (93.2)	233 (6.8)	3,435 (100.0)	10	616	4,061
2.5～ (%)	12,134 (94.0)	776 (6.0)	12,910 (100.0)	20	2,506	15,436
3.0～ (%)	52,691 (95.6)	2,414 (4.4)	55,105 (100.0)	68	10,935	66,108
3.5～ (%)	109,034 (96.8)	3,620 (3.2)	112,654 (100.0)	140	22,441	135,235
4.0～ (%)	40,646 (97.3)	1,107 (2.7)	41,753 (100.0)	56	8,699	50,508
4.5～ (%)	2,387 (97.9)	52 (2.1)	2,439 (100.0)	4	471	2,914
5.0～ (%)	175 (96.2)	7 (3.8)	182 (100.0)		21	203
合計 (%)	221,170 (96.4)	8,295 (3.6)	229,465 (100.0)	302	45,872	275,639
記載なし (%)	7,637 (93.9)	492 (6.1)	8,129 (100.0)	18	26,322	34,469
総計 (%)	228,807 (96.3)	8,787 (3.7)	237,594 (100.0)	320	72,194	310,108
平均	3.60	3.47	3.59	3.55	3.60	3.60
標準偏差	0.44	0.49	0.44	0.52	0.44	0.44

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査