

表 1130 四肢切断の有無 透析前CRP濃度(mg/dL)別（透析患者全体）

透析前CRP濃度	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
0.2未満 (%)	109,861 (97.5)	2,853 (2.5)	112,714 (100.0)	186	22,409	135,309
0.2～ (%)	36,109 (96.0)	1,502 (4.0)	37,611 (100.0)	44	7,152	44,807
0.5～ (%)	17,944 (94.8)	985 (5.2)	18,929 (100.0)	25	3,803	22,757
1.0～ (%)	11,581 (93.8)	767 (6.2)	12,348 (100.0)	16	2,384	14,748
2.0～ (%)	7,058 (93.2)	515 (6.8)	7,573 (100.0)	6	1,426	9,005
4.0～ (%)	2,504 (92.5)	202 (7.5)	2,706 (100.0)	6	532	3,244
6.0～ (%)	1,223 (92.6)	98 (7.4)	1,321 (100.0)	3	252	1,576
8.0～ (%)	649 (90.4)	69 (9.6)	718 (100.0)	2	150	870
10.0～ (%)	816 (91.5)	76 (8.5)	892 (100.0)	3	139	1,034
15.0～ (%)	524 (90.0)	58 (10.0)	582 (100.0)	4	107	693
合計 (%)	188,269 (96.4)	7,125 (3.6)	195,394 (100.0)	295	38,354	234,043
記載なし (%)	40,538 (96.1)	1,662 (3.9)	42,200 (100.0)	25	33,840	76,065
総計 (%)	228,807 (96.3)	8,787 (3.7)	237,594 (100.0)	320	72,194	310,108
平均	0.62	1.17	0.64	0.96	0.61	0.63
標準偏差	1.91	2.76	1.95	3.20	1.72	1.92

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査