

表 1131 四肢切断の有無 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL)別（透析患者全体）

透析前補正 カルシウム濃度	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
7.0未満 (%)	938 (96.4)	35 (3.6)	973 (100.0)	1	168	1,142
7.0～ (%)	1,342 (97.5)	34 (2.5)	1,376 (100.0)		273	1,649
7.5～ (%)	5,051 (96.6)	178 (3.4)	5,229 (100.0)	4	1,166	6,399
8.0～ (%)	16,366 (96.7)	557 (3.3)	16,923 (100.0)	19	3,497	20,439
8.4～ (%)	4,777 (96.5)	173 (3.5)	4,950 (100.0)	5	917	5,872
8.5～ (%)	54,130 (96.7)	1,856 (3.3)	55,986 (100.0)	85	11,248	67,319
9.0～ (%)	66,085 (96.4)	2,461 (3.6)	68,546 (100.0)	98	13,360	82,004
9.5～ (%)	43,329 (96.3)	1,651 (3.7)	44,980 (100.0)	44	8,945	53,969
10.0～ (%)	5,317 (96.1)	215 (3.9)	5,532 (100.0)	10	1,056	6,598
10.1～ (%)	13,461 (95.6)	613 (4.4)	14,074 (100.0)	16	2,887	16,977
10.5～ (%)	6,536 (95.5)	307 (4.5)	6,843 (100.0)	13	1,414	8,270
11.0～ (%)	2,199 (95.2)	110 (4.8)	2,309 (100.0)	5	467	2,781
11.5～ (%)	772 (95.0)	41 (5.0)	813 (100.0)		160	973
12.0～ (%)	538 (94.4)	32 (5.6)	570 (100.0)	1	110	681
合計 (%)	220,841 (96.4)	8,263 (3.6)	229,104 (100.0)	301	45,668	275,073
記載なし (%)	7,966 (93.8)	524 (6.2)	8,490 (100.0)	19	26,526	35,035
総計 (%)	228,807 (96.3)	8,787 (3.7)	237,594 (100.0)	320	72,194	310,108
平均	9.19	9.25	9.19	9.21	9.19	9.19
標準偏差	0.74	0.78	0.74	0.71	0.75	0.74

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査