

表 1132 四肢切断の有無 透析前リン濃度(mg/dL)別 (透析患者全体)

透析前リン濃度	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
3未満 (%)	8,468 (94.3)	514 (5.7)	8,982 (100.0)	7	1,897	10,886
3.0～ (%)	10,752 (95.8)	475 (4.2)	11,227 (100.0)	14	2,341	13,582
3.5～ (%)	19,034 (96.3)	734 (3.7)	19,768 (100.0)	21	3,893	23,682
4.0～ (%)	28,297 (96.2)	1,130 (3.8)	29,427 (100.0)	33	5,822	35,282
4.5～ (%)	33,898 (96.7)	1,166 (3.3)	35,064 (100.0)	46	6,949	42,059
5.0～ (%)	34,304 (96.7)	1,169 (3.3)	35,473 (100.0)	41	7,204	42,718
5.5～ (%)	29,556 (96.7)	997 (3.3)	30,553 (100.0)	40	6,112	36,705
6.0～ (%)	5,021 (96.5)	182 (3.5)	5,203 (100.0)	4	1,054	6,261
6.1～ (%)	16,877 (96.8)	562 (3.2)	17,439 (100.0)	29	3,641	21,109
6.5～ (%)	14,644 (96.5)	530 (3.5)	15,174 (100.0)	29	3,075	18,278
7.0～ (%)	8,994 (96.2)	353 (3.8)	9,347 (100.0)	15	1,915	11,277
7.5～ (%)	5,499 (96.7)	188 (3.3)	5,687 (100.0)	8	1,163	6,858
8.0～ (%)	3,229 (95.9)	137 (4.1)	3,366 (100.0)	4	683	4,053
8.5～ (%)	2,050 (95.8)	89 (4.2)	2,139 (100.0)	2	431	2,572
9.0～ (%)	3,210 (95.8)	140 (4.2)	3,350 (100.0)	9	718	4,077
合計 (%)	223,833 (96.4)	8,366 (3.6)	232,199 (100.0)	302	46,898	279,399
記載なし (%)	4,974 (92.2)	421 (7.8)	5,395 (100.0)	18	25,296	30,709
総計 (%)	228,807 (96.3)	8,787 (3.7)	237,594 (100.0)	320	72,194	310,108
平均	5.21	5.13	5.21	5.43	5.22	5.21
標準偏差	1.42	1.54	1.42	1.49	1.44	1.43

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査