

表 1133 四肢切断の有無 PTH値(pg/mL)別 (透析患者全体) PTH測定法:intact-PTH

PTH値	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	9,600 (96.0)	399 (4.0)	9,999 (100.0)	6	1,868	11,873
20～ (%)	13,635 (95.6)	630 (4.4)	14,265 (100.0)	12	2,669	16,946
40～ (%)	14,548 (96.1)	585 (3.9)	15,133 (100.0)	23	2,860	18,016
60～ (%)	15,638 (96.3)	593 (3.7)	16,231 (100.0)	22	2,977	19,230
80～ (%)	15,882 (96.2)	619 (3.8)	16,501 (100.0)	22	3,090	19,613
100～ (%)	15,429 (96.5)	562 (3.5)	15,991 (100.0)	15	3,152	19,158
120～ (%)	14,691 (96.4)	541 (3.6)	15,232 (100.0)	23	2,967	18,222
140～ (%)	13,555 (96.5)	490 (3.5)	14,045 (100.0)	17	2,745	16,807
160～ (%)	12,241 (96.7)	420 (3.3)	12,661 (100.0)	23	2,489	15,173
180～ (%)	27,766 (96.7)	950 (3.3)	28,716 (100.0)	21	5,776	34,513
240～ (%)	356 (96.0)	15 (4.0)	371 (100.0)		73	444
241～ (%)	15,961 (96.8)	536 (3.2)	16,497 (100.0)	13	3,329	19,839
300～ (%)	9,318 (96.8)	313 (3.2)	9,631 (100.0)	4	1,891	11,526
360～ (%)	5,361 (96.8)	179 (3.2)	5,540 (100.0)	3	1,141	6,684
420～ (%)	3,136 (96.8)	103 (3.2)	3,239 (100.0)	6	680	3,925
480～ (%)	782 (97.3)	22 (2.7)	804 (100.0)	1	159	964
500～ (%)	1,240 (97.2)	36 (2.8)	1,276 (100.0)	2	286	1,564
540～ (%)	1,374 (96.3)	53 (3.7)	1,427 (100.0)	1	286	1,714
600～ (%)	2,265 (96.7)	78 (3.3)	2,343 (100.0)	1	455	2,799
800～ (%)	1,798 (97.0)	55 (3.0)	1,853 (100.0)	1	308	2,162
合計 (%)	194,576 (96.4)	7,179 (3.6)	201,755 (100.0)	216	39,201	241,172
記載なし (%)	4,238 (94.8)	233 (5.2)	4,471 (100.0)	16	1,897	6,384
総計 (%)	198,814 (96.4)	7,412 (3.6)	206,226 (100.0)	232	41,098	247,556
平均	172.29	162.30	171.93	153.19	173.54	172.17
標準偏差	164.95	160.48	164.80	143.05	159.56	163.94

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査