

表 1136 四肢切断の有無 総コレステロール濃度(mg/dL)別（透析患者全体）

総コレステロール濃度	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
100未満 (%)	6,071 (93.3)	437 (6.7)	6,508 (100.0)	7	1,315	7,830
100～ (%)	17,737 (94.8)	973 (5.2)	18,710 (100.0)	18	3,994	22,722
120～ (%)	33,430 (95.8)	1,461 (4.2)	34,891 (100.0)	44	7,266	42,201
140～ (%)	38,825 (96.5)	1,392 (3.5)	40,217 (100.0)	35	8,407	48,659
160～ (%)	32,369 (97.0)	999 (3.0)	33,368 (100.0)	37	6,838	40,243
180～ (%)	20,515 (97.3)	575 (2.7)	21,090 (100.0)	14	4,421	25,525
200～ (%)	11,025 (97.8)	243 (2.2)	11,268 (100.0)	20	2,435	13,723
220～ (%)	4,848 (97.8)	108 (2.2)	4,956 (100.0)	5	1,110	6,071
240～ (%)	1,925 (97.4)	51 (2.6)	1,976 (100.0)	2	422	2,400
260～ (%)	1,246 (98.3)	21 (1.7)	1,267 (100.0)	6	313	1,586
合計 (%)	167,991 (96.4)	6,260 (3.6)	174,251 (100.0)	188	36,521	210,960
記載なし (%)	60,816 (96.0)	2,527 (4.0)	63,343 (100.0)	132	35,673	99,148
総計 (%)	228,807 (96.3)	8,787 (3.7)	237,594 (100.0)	320	72,194	310,108
平均	156.14	145.92	155.77	159.95	156.24	155.86
標準偏差	35.61	34.56	35.62	41.46	36.25	35.74

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査