

表 1137 四肢切断の有無 HDL-C濃度(mg/dL)別（透析患者全体）

HDL-C濃度	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満	611	51	662	1	133	796
(%)	(92.3)	(7.7)	(100.0)			
20～	12,304	833	13,137	11	2,475	15,623
(%)	(93.7)	(6.3)	(100.0)			
30～	36,687	1,745	38,432	40	7,375	45,847
(%)	(95.5)	(4.5)	(100.0)			
40～	41,380	1,505	42,885	47	8,420	51,352
(%)	(96.5)	(3.5)	(100.0)			
50～	30,372	822	31,194	35	6,332	37,561
(%)	(97.4)	(2.6)	(100.0)			
60～	18,121	397	18,518	23	3,695	22,236
(%)	(97.9)	(2.1)	(100.0)			
70～	8,899	177	9,076	12	1,904	10,992
(%)	(98.0)	(2.0)	(100.0)			
80～	4,232	76	4,308	5	916	5,229
(%)	(98.2)	(1.8)	(100.0)			
90～	1,838	39	1,877	1	453	2,331
(%)	(97.9)	(2.1)	(100.0)			
100～	1,532	33	1,565	2	434	2,001
(%)	(97.9)	(2.1)	(100.0)			
合計	155,976	5,678	161,654	177	32,137	193,968
(%)	(96.5)	(3.5)	(100.0)			
記載なし	72,831	3,109	75,940	143	40,057	116,140
(%)	(95.9)	(4.1)	(100.0)			
総計	228,807	8,787	237,594	320	72,194	310,108
(%)	(96.3)	(3.7)	(100.0)			
平均	48.80	43.33	48.61	49.51	49.46	48.75
標準偏差	16.58	15.32	16.56	16.16	17.39	16.71

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査