

表 1138 四肢切断の有無 Non-HDL-C濃度(mg/dL)別（透析患者全体）

Non-HDL-C濃度	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
50未満	2,641	151	2,792	3	615	3,410
(%)	(94.6)	(5.4)	(100.0)			
50～	12,524	600	13,124	15	2,962	16,101
(%)	(95.4)	(4.6)	(100.0)			
70～	28,064	1,166	29,230	35	6,304	35,569
(%)	(96.0)	(4.0)	(100.0)			
90～	33,795	1,225	35,020	44	7,314	42,378
(%)	(96.5)	(3.5)	(100.0)			
110～	27,488	906	28,394	32	5,777	34,203
(%)	(96.8)	(3.2)	(100.0)			
130～	16,825	522	17,347	18	3,598	20,963
(%)	(97.0)	(3.0)	(100.0)			
150～	8,429	272	8,701	16	1,873	10,590
(%)	(96.9)	(3.1)	(100.0)			
170～	3,811	118	3,929	2	791	4,722
(%)	(97.0)	(3.0)	(100.0)			
190～	1,448	54	1,502	2	305	1,809
(%)	(96.4)	(3.6)	(100.0)			
210～	859	25	884	5	235	1,124
(%)	(97.2)	(2.8)	(100.0)			
合計	135,884	5,039	140,923	172	29,774	170,869
(%)	(96.4)	(3.6)	(100.0)			
記載なし	92,923	3,748	96,671	148	42,420	139,239
(%)	(96.1)	(3.9)	(100.0)			
総計	228,807	8,787	237,594	320	72,194	310,108
(%)	(96.3)	(3.7)	(100.0)			
平均	107.32	102.76	107.16	110.52	106.69	107.08
標準偏差	33.48	33.74	33.50	38.02	34.07	33.61

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査