

表 1139 四肢切断の有無 透析前収縮期血圧(mmHg)別（透析患者全体）

透析前収縮 期血圧	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
60未満 (%)	29 (93.5)	2 (6.5)	31 (100.0)		9	40
60～ (%)	346 (95.8)	15 (4.2)	361 (100.0)	1	71	433
80～ (%)	2,649 (94.8)	144 (5.2)	2,793 (100.0)	2	543	3,338
100～ (%)	14,156 (96.2)	552 (3.8)	14,708 (100.0)	13	2,886	17,607
120～ (%)	43,282 (97.2)	1,261 (2.8)	44,543 (100.0)	51	8,677	53,271
140～ (%)	65,521 (96.9)	2,094 (3.1)	67,615 (100.0)	77	13,130	80,822
160～ (%)	46,631 (96.2)	1,854 (3.8)	48,485 (100.0)	65	9,645	58,195
180～ (%)	17,629 (94.9)	939 (5.1)	18,568 (100.0)	29	3,627	22,224
200～ (%)	4,352 (93.6)	300 (6.4)	4,652 (100.0)	5	889	5,546
220～ (%)	895 (92.0)	78 (8.0)	973 (100.0)	1	186	1,160
合計 (%)	195,490 (96.4)	7,239 (3.6)	202,729 (100.0)	244	39,663	242,636
記載なし (%)	33,317 (95.6)	1,548 (4.4)	34,865 (100.0)	76	32,531	67,472
総計 (%)	228,807 (96.3)	8,787 (3.7)	237,594 (100.0)	320	72,194	310,108
平均	150.97	154.93	151.11	153.57	151.22	151.13
標準偏差	24.10	27.35	24.23	24.26	24.21	24.23

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査