

表 1141 四肢切断の有無 透析前脈拍(拍/分)別 (透析患者全体)

透析前脈拍	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
40未満	137	15	152		33	185
(%)	(90.1)	(9.9)	(100.0)			
40～	1,953	62	2,015		366	2,381
(%)	(96.9)	(3.1)	(100.0)			
50～	16,015	432	16,447	18	3,047	19,512
(%)	(97.4)	(2.6)	(100.0)			
60～	49,470	1,466	50,936	54	9,791	60,781
(%)	(97.1)	(2.9)	(100.0)			
70～	59,310	2,087	61,397	70	11,805	73,272
(%)	(96.6)	(3.4)	(100.0)			
80～	37,218	1,688	38,906	68	7,840	46,814
(%)	(95.7)	(4.3)	(100.0)			
90～	16,346	856	17,202	21	3,367	20,590
(%)	(95.0)	(5.0)	(100.0)			
100～	5,148	273	5,421	9	963	6,393
(%)	(95.0)	(5.0)	(100.0)			
110～	1,239	59	1,298	2	228	1,528
(%)	(95.5)	(4.5)	(100.0)			
120～	550	23	573		82	655
(%)	(96.0)	(4.0)	(100.0)			
合計	187,386	6,961	194,347	242	37,522	232,111
(%)	(96.4)	(3.6)	(100.0)			
記載なし	41,421	1,826	43,247	78	34,672	77,997
(%)	(95.8)	(4.2)	(100.0)			
総計	228,807	8,787	237,594	320	72,194	310,108
(%)	(96.3)	(3.7)	(100.0)			
平均	74.58	77.19	74.67	76.65	74.76	74.69
標準偏差	12.85	13.26	12.88	12.31	12.62	12.84

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査