

表 1144 四肢切断の有無 透析歴(年)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析歴	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
2年未満 (%)	41,164 (97.8)	919 (2.2)	42,083 (100.0)	90	8,542	50,715
2年～ (%)	46,167 (96.5)	1,650 (3.5)	47,817 (100.0)	78	10,394	58,289
5年～ (%)	46,664 (95.1)	2,402 (4.9)	49,066 (100.0)	47	10,114	59,227
10年～ (%)	23,573 (94.8)	1,300 (5.2)	24,873 (100.0)	17	5,142	30,032
15年～ (%)	12,098 (96.1)	486 (3.9)	12,584 (100.0)	12	2,653	15,249
20年～ (%)	6,424 (97.4)	174 (2.6)	6,598 (100.0)	7	1,326	7,931
25年～ (%)	3,245 (97.8)	72 (2.2)	3,317 (100.0)	4	723	4,044
30年～ (%)	1,755 (97.2)	50 (2.8)	1,805 (100.0)	2	376	2,183
35年～ (%)	839 (96.7)	29 (3.3)	868 (100.0)	2	163	1,033
40年～ (%)	174 (96.1)	7 (3.9)	181 (100.0)		40	221
合計 (%)	182,103 (96.3)	7,089 (3.7)	189,192 (100.0)	259	39,473	228,924
不明 (%)	24 (100.0)		24 (100.0)	1	22	47
記載なし (%)						
総計 (%)	182,127 (96.3)	7,089 (3.7)	189,216 (100.0)	260	39,495	228,971
平均	6.96	7.58	6.98	5.26	6.96	6.98
標準偏差	7.07	6.25	7.04	6.89	7.01	7.04

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査