

表 1152 四肢切断の有無 透析時間(時間/回)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

透析時間	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
3.0未満	394	13	407	2	112	521
(%)	(96.8)	(3.2)	(100.0)			
3.0～	19,740	650	20,390	54	4,376	24,820
(%)	(96.8)	(3.2)	(100.0)			
3.5～	14,320	524	14,844	26	3,069	17,939
(%)	(96.5)	(3.5)	(100.0)			
4.0～	123,332	5,008	128,340	159	26,499	154,998
(%)	(96.1)	(3.9)	(100.0)			
4.5～	9,590	326	9,916	12	1,750	11,678
(%)	(96.7)	(3.3)	(100.0)			
5.0～	12,440	469	12,909	6	2,672	15,587
(%)	(96.4)	(3.6)	(100.0)			
5.5～	494	13	507		88	595
(%)	(97.4)	(2.6)	(100.0)			
6.0～	830	33	863		131	994
(%)	(96.2)	(3.8)	(100.0)			
6.5～	53	2	55		3	58
(%)	(96.4)	(3.6)	(100.0)			
7.0～	429	14	443		68	511
(%)	(96.8)	(3.2)	(100.0)			
合計	181,622	7,052	188,674	259	38,768	227,701
(%)	(96.3)	(3.7)	(100.0)			
記載なし	505	37	542	1	727	1,270
(%)	(93.2)	(6.8)	(100.0)			
総計	182,127	7,089	189,216	260	39,495	228,971
(%)	(96.3)	(3.7)	(100.0)			
平均	3.97	3.98	3.97	3.80	3.97	3.97
標準偏差	0.53	0.49	0.52	0.50	0.52	0.52

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査