

表 1155 四肢切断の有無 透析後体重(kg)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析後体重	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満	68	4	72		12	84
(%)	(94.4)	(5.6)	(100.0)			
20～	635	33	668	1	133	802
(%)	(95.1)	(4.9)	(100.0)			
30～	15,444	557	16,001	20	3,096	19,117
(%)	(96.5)	(3.5)	(100.0)			
40～	48,278	1,697	49,975	65	9,769	59,809
(%)	(96.6)	(3.4)	(100.0)			
50～	58,066	2,112	60,178	94	11,837	72,109
(%)	(96.5)	(3.5)	(100.0)			
60～	35,455	1,428	36,883	51	7,148	44,082
(%)	(96.1)	(3.9)	(100.0)			
70～	13,827	601	14,428	20	2,736	17,184
(%)	(95.8)	(4.2)	(100.0)			
80～	4,840	286	5,126	3	952	6,081
(%)	(94.4)	(5.6)	(100.0)			
90～	1,735	119	1,854	1	340	2,195
(%)	(93.6)	(6.4)	(100.0)			
100～	588	43	631		124	755
(%)	(93.2)	(6.8)	(100.0)			
110～	235	13	248	1	50	299
(%)	(94.8)	(5.2)	(100.0)			
120～	147	14	161		28	189
(%)	(91.3)	(8.7)	(100.0)			
合計	179,318	6,907	186,225	256	36,225	222,706
(%)	(96.3)	(3.7)	(100.0)			
記載なし	2,809	182	2,991	4	3,270	6,265
(%)	(93.9)	(6.1)	(100.0)			
総計	182,127	7,089	189,216	260	39,495	228,971
(%)	(96.3)	(3.7)	(100.0)			
平均	55.41	57.03	55.47	54.80	55.34	55.45
標準偏差	12.86	14.30	12.92	11.54	12.78	12.90

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査