

表 1156 四肢切断の有無 体重減少量(kg)別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

体重減少量	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
0.0未満	583	31	614		141	755
(%)	(95.0)	(5.0)	(100.0)			
0.0～	6,656	321	6,977	20	1,453	8,450
(%)	(95.4)	(4.6)	(100.0)			
1.0～	32,683	1,454	34,137	46	6,842	41,025
(%)	(95.7)	(4.3)	(100.0)			
2.0～	58,758	2,349	61,107	71	11,983	73,161
(%)	(96.2)	(3.8)	(100.0)			
3.0～	30,664	1,317	31,981	26	6,103	38,110
(%)	(95.9)	(4.1)	(100.0)			
4.0～	7,486	397	7,883	2	1,560	9,445
(%)	(95.0)	(5.0)	(100.0)			
5.0～	1,536	103	1,639	1	318	1,958
(%)	(93.7)	(6.3)	(100.0)			
6.0～	324	21	345		50	395
(%)	(93.9)	(6.1)	(100.0)			
7.0～	70	7	77		18	95
(%)	(90.9)	(9.1)	(100.0)			
8.0～	131	6	137		23	160
(%)	(95.6)	(4.4)	(100.0)			
合計	138,891	6,006	144,897	166	28,491	173,554
(%)	(95.9)	(4.1)	(100.0)			
記載なし	2,048	164	2,212	3	2,440	4,655
(%)	(92.6)	(7.4)	(100.0)			
総計	140,939	6,170	147,109	169	30,931	178,209
(%)	(95.8)	(4.2)	(100.0)			
平均	2.49	2.51	2.49	2.09	2.47	2.49
標準偏差	1.05	1.10	1.05	0.92	1.03	1.05

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査