

表 1157 四肢切断の有無 体重減少率(%)別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

体重減少率	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
1.0未満 (%)	2,909 (95.1)	149 (4.9)	3,058 (100.0)	10	628	3,696
1.0～ (%)	5,182 (95.2)	260 (4.8)	5,442 (100.0)	11	1,156	6,609
2.0～ (%)	13,344 (95.3)	657 (4.7)	14,001 (100.0)	26	2,894	16,921
3.0～ (%)	27,700 (95.6)	1,275 (4.4)	28,975 (100.0)	35	5,574	34,584
4.0～ (%)	37,164 (95.9)	1,575 (4.1)	38,739 (100.0)	39	7,637	46,415
5.0～ (%)	29,287 (96.3)	1,132 (3.7)	30,419 (100.0)	28	5,842	36,289
6.0～ (%)	14,815 (96.1)	605 (3.9)	15,420 (100.0)	12	2,995	18,427
7.0～ (%)	5,689 (96.3)	219 (3.7)	5,908 (100.0)	3	1,197	7,108
8.0～ (%)	1,773 (95.9)	75 (4.1)	1,848 (100.0)	2	345	2,195
9.0～ (%)	941 (94.4)	56 (5.6)	997 (100.0)		208	1,205
合計 (%)	138,804 (95.9)	6,003 (4.1)	144,807 (100.0)	166	28,476	173,449
記載なし (%)	2,135 (92.7)	167 (7.3)	2,302 (100.0)	3	2,455	4,760
総計 (%)	140,939 (95.8)	6,170 (4.2)	147,109 (100.0)	169	30,931	178,209
平均	4.54	4.43	4.54	3.94	4.51	4.53
標準偏差	1.64	1.73	1.65	1.70	1.67	1.65

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査