

表 1160 四肢切断の有無 透析前クレアチニン濃度(mg/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

透析前クレアチニン 濃度	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
2未満 (%)	60 (95.2)	3 (4.8)	63 (100.0)		13	76
2～ (%)	1,247 (90.7)	128 (9.3)	1,375 (100.0)	2	279	1,656
4～ (%)	5,904 (90.9)	593 (9.1)	6,497 (100.0)	4	1,294	7,795
6～ (%)	18,777 (93.6)	1,293 (6.4)	20,070 (100.0)	21	3,915	24,006
8～ (%)	36,978 (95.5)	1,737 (4.5)	38,715 (100.0)	49	7,351	46,115
10～ (%)	38,619 (96.5)	1,403 (3.5)	40,022 (100.0)	48	7,964	48,034
12～ (%)	24,250 (97.5)	625 (2.5)	24,875 (100.0)	27	4,852	29,754
14～ (%)	9,903 (98.2)	183 (1.8)	10,086 (100.0)	10	1,940	12,036
16～ (%)	3,364 (98.4)	56 (1.6)	3,420 (100.0)	2	678	4,100
合計 (%)	139,102 (95.9)	6,021 (4.1)	145,123 (100.0)	163	28,286	173,572
記載なし (%)	1,837 (92.5)	149 (7.5)	1,986 (100.0)	6	2,645	4,637
総計 (%)	140,939 (95.8)	6,170 (4.2)	147,109 (100.0)	169	30,931	178,209
平均	10.34	9.15	10.29	10.22	10.30	10.29
標準偏差	2.78	2.71	2.78	2.54	2.81	2.79

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査