

表 1163 四肢切断の有無 nPCR(g/kg/day)別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

nPCR	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満	301	21	322	1	46	369
(%)	(93.5)	(6.5)	(100.0)			
0.4～	6,553	451	7,004	16	1,398	8,418
(%)	(93.6)	(6.4)	(100.0)			
0.6～	40,747	2,148	42,895	50	8,011	50,956
(%)	(95.0)	(5.0)	(100.0)			
0.8～	56,956	2,184	59,140	55	11,316	70,511
(%)	(96.3)	(3.7)	(100.0)			
1.0～	23,053	671	23,724	27	4,497	28,248
(%)	(97.2)	(2.8)	(100.0)			
1.2～	4,007	115	4,122	7	787	4,916
(%)	(97.2)	(2.8)	(100.0)			
1.4～	449	12	461	1	93	555
(%)	(97.4)	(2.6)	(100.0)			
1.6～	65	1	66		13	79
(%)	(98.5)	(1.5)	(100.0)			
1.8～	21	1	22		3	25
(%)	(95.5)	(4.5)	(100.0)			
2.0～	34		34		4	38
(%)	(100.0)		(100.0)			
合計	132,186	5,604	137,790	157	26,168	164,115
(%)	(95.9)	(4.1)	(100.0)			
記載なし	8,753	566	9,319	12	4,763	14,094
(%)	(93.9)	(6.1)	(100.0)			
総計	140,939	6,170	147,109	169	30,931	178,209
(%)	(95.8)	(4.2)	(100.0)			
平均	0.86	0.82	0.86	0.85	0.86	0.86
標準偏差	0.18	0.17	0.18	0.19	0.18	0.18

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査