

表 1165 四肢切断の有無 透析前アルブミン濃度(g/dL)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

透析前アルブミン濃度	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
1.5未満 (%)	124 (96.1)	5 (3.9)	129 (100.0)	1	16	146
1.5～ (%)	579 (89.9)	65 (10.1)	644 (100.0)	3	124	771
2.0～ (%)	2,519 (93.1)	187 (6.9)	2,706 (100.0)	9	464	3,179
2.5～ (%)	9,648 (93.8)	633 (6.2)	10,281 (100.0)	15	1,854	12,150
3.0～ (%)	41,898 (95.5)	1,994 (4.5)	43,892 (100.0)	52	8,138	52,082
3.5～ (%)	87,030 (96.7)	2,952 (3.3)	89,982 (100.0)	122	17,031	107,135
4.0～ (%)	32,796 (97.2)	928 (2.8)	33,724 (100.0)	45	6,737	40,506
4.5～ (%)	1,938 (97.6)	47 (2.4)	1,985 (100.0)	2	375	2,362
5.0～ (%)	149 (95.5)	7 (4.5)	156 (100.0)		16	172
合計 (%)	176,681 (96.3)	6,818 (3.7)	183,499 (100.0)	249	34,755	218,503
記載なし (%)	5,446 (95.3)	271 (4.7)	5,717 (100.0)	11	4,740	10,468
総計 (%)	182,127 (96.3)	7,089 (3.7)	189,216 (100.0)	260	39,495	228,971
平均	3.60	3.47	3.60	3.55	3.61	3.60
標準偏差	0.44	0.50	0.44	0.52	0.44	0.44

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査