

表 1166 四肢切断の有無 透析前CRP濃度(mg/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析前CRP濃度	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
0.2未満 (%)	86,303 (97.4)	2,335 (2.6)	88,638 (100.0)	160	16,731	105,529
0.2～ (%)	28,751 (95.9)	1,226 (4.1)	29,977 (100.0)	36	5,365	35,378
0.5～ (%)	14,423 (94.6)	821 (5.4)	15,244 (100.0)	21	2,882	18,147
1.0～ (%)	9,362 (93.9)	612 (6.1)	9,974 (100.0)	9	1,789	11,772
2.0～ (%)	5,720 (93.1)	424 (6.9)	6,144 (100.0)	4	1,106	7,254
4.0～ (%)	2,014 (92.3)	169 (7.7)	2,183 (100.0)	6	393	2,582
6.0～ (%)	1,009 (92.6)	81 (7.4)	1,090 (100.0)	1	191	1,282
8.0～ (%)	537 (91.8)	48 (8.2)	585 (100.0)	1	108	694
10.0～ (%)	665 (91.3)	63 (8.7)	728 (100.0)	3	111	842
15.0～ (%)	429 (90.3)	46 (9.7)	475 (100.0)	4	81	560
合計 (%)	149,213 (96.2)	5,825 (3.8)	155,038 (100.0)	245	28,757	184,040
記載なし (%)	32,914 (96.3)	1,264 (3.7)	34,178 (100.0)	15	10,738	44,931
総計 (%)	182,127 (96.3)	7,089 (3.7)	189,216 (100.0)	260	39,495	228,971
平均	0.63	1.16	0.65	0.98	0.61	0.64
標準偏差	1.94	2.75	1.98	3.42	1.73	1.94

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査