

表 1167 四肢切断の有無 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析前補正 カルシウム濃度	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
7.0未満 (%)	724 (96.8)	24 (3.2)	748 (100.0)	1	125	874
7.0～ (%)	1,034 (97.5)	26 (2.5)	1,060 (100.0)		206	1,266
7.5～ (%)	3,959 (96.6)	141 (3.4)	4,100 (100.0)	3	868	4,971
8.0～ (%)	13,135 (96.7)	453 (3.3)	13,588 (100.0)	17	2,685	16,290
8.4～ (%)	3,827 (96.4)	143 (3.6)	3,970 (100.0)	4	702	4,676
8.5～ (%)	43,586 (96.6)	1,540 (3.4)	45,126 (100.0)	68	8,708	53,902
9.0～ (%)	53,014 (96.3)	2,024 (3.7)	55,038 (100.0)	84	10,114	65,236
9.5～ (%)	34,364 (96.2)	1,348 (3.8)	35,712 (100.0)	33	6,659	42,404
10.0～ (%)	4,251 (95.9)	182 (4.1)	4,433 (100.0)	8	786	5,227
10.1～ (%)	10,605 (95.4)	509 (4.6)	11,114 (100.0)	14	2,149	13,277
10.5～ (%)	5,157 (95.3)	254 (4.7)	5,411 (100.0)	12	1,030	6,453
11.0～ (%)	1,723 (94.9)	92 (5.1)	1,815 (100.0)	3	347	2,165
11.5～ (%)	609 (94.7)	34 (5.3)	643 (100.0)		126	769
12.0～ (%)	432 (94.3)	26 (5.7)	458 (100.0)	1	80	539
合計 (%)	176,420 (96.3)	6,796 (3.7)	183,216 (100.0)	248	34,585	218,049
記載なし (%)	5,707 (95.1)	293 (4.9)	6,000 (100.0)	12	4,910	10,922
総計 (%)	182,127 (96.3)	7,089 (3.7)	189,216 (100.0)	260	39,495	228,971
平均	9.18	9.26	9.19	9.20	9.18	9.18
標準偏差	0.74	0.77	0.74	0.71	0.74	0.74

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査