

表 1169 四肢切断の有無 PTH値(pg/mL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）PTH測定法:intact-PTH

PTH値	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	7,702 (95.8)	334 (4.2)	8,036 (100.0)	5	1,471	9,512
20～ (%)	11,128 (95.5)	520 (4.5)	11,648 (100.0)	12	2,069	13,729
40～ (%)	11,794 (96.0)	492 (4.0)	12,286 (100.0)	20	2,219	14,525
60～ (%)	12,698 (96.3)	493 (3.7)	13,191 (100.0)	19	2,304	15,514
80～ (%)	12,765 (96.2)	505 (3.8)	13,270 (100.0)	21	2,380	15,671
100～ (%)	12,383 (96.4)	465 (3.6)	12,848 (100.0)	15	2,408	15,271
120～ (%)	11,867 (96.4)	449 (3.6)	12,316 (100.0)	21	2,249	14,586
140～ (%)	10,939 (96.4)	403 (3.6)	11,342 (100.0)	15	2,146	13,503
160～ (%)	9,801 (96.5)	358 (3.5)	10,159 (100.0)	21	1,927	12,107
180～ (%)	22,218 (96.6)	782 (3.4)	23,000 (100.0)	19	4,409	27,428
240～ (%)	268 (95.7)	12 (4.3)	280 (100.0)		58	338
241～ (%)	12,632 (96.6)	449 (3.4)	13,081 (100.0)	13	2,504	15,598
300～ (%)	7,302 (96.7)	252 (3.3)	7,554 (100.0)	4	1,434	8,992
360～ (%)	4,173 (96.7)	141 (3.3)	4,314 (100.0)	3	807	5,124
420～ (%)	2,468 (97.2)	71 (2.8)	2,539 (100.0)	6	479	3,024
480～ (%)	594 (96.7)	20 (3.3)	614 (100.0)	1	121	736
500～ (%)	962 (97.4)	26 (2.6)	988 (100.0)	2	199	1,189
540～ (%)	1,054 (96.1)	43 (3.9)	1,097 (100.0)		213	1,310
600～ (%)	1,731 (96.5)	62 (3.5)	1,793 (100.0)	1	338	2,132
800～ (%)	1,354 (96.9)	43 (3.1)	1,397 (100.0)	1	224	1,622
合計 (%)	155,833 (96.3)	5,920 (3.7)	161,753 (100.0)	199	29,959	191,911
記載なし (%)	3,178 (94.7)	177 (5.3)	3,355 (100.0)	16	1,304	4,675
総計 (%)	159,011 (96.3)	6,097 (3.7)	165,108 (100.0)	215	31,263	196,586
平均	170.15	160.32	169.79	154.49	171.02	169.97
標準偏差	161.81	159.74	161.74	144.65	156.83	160.97

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査