

表 1172 四肢切断の有無 総コレステロール濃度(mg/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

| 総コレステロール濃度   | 切断なし              | 切断あり           | 合計                 | 不明     | 記載なし   | 総計      |
|--------------|-------------------|----------------|--------------------|--------|--------|---------|
| 100未満<br>(%) | 5,055<br>(93.3)   | 362<br>(6.7)   | 5,417<br>(100.0)   | 6      | 1,031  | 6,454   |
| 100～<br>(%)  | 14,738<br>(94.9)  | 800<br>(5.1)   | 15,538<br>(100.0)  | 16     | 3,066  | 18,620  |
| 120～<br>(%)  | 27,451<br>(95.8)  | 1,208<br>(4.2) | 28,659<br>(100.0)  | 36     | 5,620  | 34,315  |
| 140～<br>(%)  | 31,216<br>(96.5)  | 1,143<br>(3.5) | 32,359<br>(100.0)  | 26     | 6,441  | 38,826  |
| 160～<br>(%)  | 25,606<br>(96.9)  | 817<br>(3.1)   | 26,423<br>(100.0)  | 27     | 5,133  | 31,583  |
| 180～<br>(%)  | 15,854<br>(97.2)  | 463<br>(2.8)   | 16,317<br>(100.0)  | 10     | 3,292  | 19,619  |
| 200～<br>(%)  | 8,236<br>(97.7)   | 193<br>(2.3)   | 8,429<br>(100.0)   | 10     | 1,770  | 10,209  |
| 220～<br>(%)  | 3,580<br>(97.5)   | 91<br>(2.5)    | 3,671<br>(100.0)   | 3      | 801    | 4,475   |
| 240～<br>(%)  | 1,392<br>(97.1)   | 42<br>(2.9)    | 1,434<br>(100.0)   | 2      | 297    | 1,733   |
| 260～<br>(%)  | 883<br>(98.3)     | 15<br>(1.7)    | 898<br>(100.0)     | 5      | 208    | 1,111   |
| 合計<br>(%)    | 134,011<br>(96.3) | 5,134<br>(3.7) | 139,145<br>(100.0) | 141    | 27,659 | 166,945 |
| 記載なし<br>(%)  | 48,116<br>(96.1)  | 1,955<br>(3.9) | 50,071<br>(100.0)  | 119    | 11,836 | 62,026  |
| 総計<br>(%)    | 182,127<br>(96.3) | 7,089<br>(3.7) | 189,216<br>(100.0) | 260    | 39,495 | 228,971 |
| 平均           | 154.91            | 145.66         | 154.57             | 156.66 | 155.43 | 154.71  |
| 標準偏差         | 35.14             | 34.39          | 35.15              | 41.92  | 35.90  | 35.28   |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査