

表 1173 四肢切断の有無 HDL-C濃度(mg/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

HDL-C濃度	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満	527	40	567	1	103	671
(%)	(92.9)	(7.1)	(100.0)			
20～	10,244	681	10,925	7	1,914	12,846
(%)	(93.8)	(6.2)	(100.0)			
30～	29,758	1,451	31,209	30	5,649	36,888
(%)	(95.4)	(4.6)	(100.0)			
40～	33,153	1,229	34,382	36	6,311	40,729
(%)	(96.4)	(3.6)	(100.0)			
50～	23,740	655	24,395	30	4,655	29,080
(%)	(97.3)	(2.7)	(100.0)			
60～	13,767	307	14,074	18	2,700	16,792
(%)	(97.8)	(2.2)	(100.0)			
70～	6,685	140	6,825	10	1,366	8,201
(%)	(97.9)	(2.1)	(100.0)			
80～	3,113	67	3,180	5	649	3,834
(%)	(97.9)	(2.1)	(100.0)			
90～	1,362	29	1,391		342	1,733
(%)	(97.9)	(2.1)	(100.0)			
100～	1,097	26	1,123		335	1,458
(%)	(97.7)	(2.3)	(100.0)			
合計	123,446	4,625	128,071	137	24,024	152,232
(%)	(96.4)	(3.6)	(100.0)			
記載なし	58,681	2,464	61,145	123	15,471	76,739
(%)	(96.0)	(4.0)	(100.0)			
総計	182,127	7,089	189,216	260	39,495	228,971
(%)	(96.3)	(3.7)	(100.0)			
平均	48.26	43.15	48.08	49.43	49.17	48.25
標準偏差	16.37	15.17	16.35	14.87	17.50	16.54

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査